

FRENECTOMIA LINGUAL NO PACIENTE INFANTIL: REVISÃO DE LITERATURA

Guilherme Lopes de Souza*

João Victor leão Almeida *

Joicy Caroline Ferreira Barbosa*

Kissila Anattuhane Gonçalves Soares Dias *

Mariana Rodrigues Pimenta*

Pedro Henrique Sá Neves*

Thaís Aparecida Santos*

Marileny Boechat Frauches Brandão**

ODONTOPEDIATRIA

080103

* Acadêmicos do 8º período do Curso de Odontologia da UNIVALE

** Professor Orientador

Introdução: A língua presa ou anquiloglossia é uma alteração no freio lingual que pode estar relacionada a um encurtamento do freio, ou uma inserção muito próxima do mesmo ao ápice da língua. A frenectomia lingual é o procedimento cirúrgico que visa a remoção do freio lingual e bridas com inserção anormal, permitindo tanto a movimentação ortodôntica para fechamento de diastemas, como a movimentação adequada da língua, necessária às atividades funcionais. **Objetivo:** Abordar a realização de uma frenectomia lingual em pacientes pediátricos, relacionando o diagnóstico e os resultados. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio de análise de artigos indexados na base de dados Google Acadêmico. Os artigos deveriam estar em língua portuguesa e publicados entre os anos de 2017 a 2023, sendo que os descritores utilizados foram freio lingual, anquiloglossia, frenectomia lingual e odontopediatria. **Resultados:** Na base de dados consultada foram encontrados 283 artigos relacionados aos descritores citados, e sete destes atendiam aos critérios de inclusão/exclusão deste estudo. Observou-se que a frenectomia lingual é uma técnica cirúrgica de fácil execução e deve ser selecionada de acordo com cada caso, pois apresenta indicações e vantagens específicas. Quando bem indicada proporciona uma melhoria dos movimentos da língua, deglutição, fonação e dicção após o procedimento cirúrgico. **Conclusão:** Conclui-se que a frenectomia lingual é um procedimento eficaz, quando o diagnóstico e o planejamento são bem realizados, pois contribui para restabelecer as funções motriciais da língua. O diagnóstico e tratamento deve envolver uma equipe multidisciplinar, constituída por pediatra, cirurgião-dentista e fonoaudiólogo.

Palavras chaves: Freio lingual, anquiloglossia, frenectomia lingual, odontopediatria.